



**ESPECIALIDADES**

# TORVAN

# ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PARA BAÑO

## Insecticida para el control de garrapatas, tórsalo y moscas Indicaciones:

Para el control de parásitos externos como garrapatas, moscas de la paleta y los cuernos, colmoyote (*Dermatobia hominis*), tábanos, tórsalo, mosquitos y ácaros de la sarna (jiote).

## Composición:

2,2-Diclorovinil, Dimetil Ester de Ácido Fosfórico (Diclorvos) 76 g.

## Administración:

Por aspersión con bomba de mochila. La cantidad de pulverizado para un vacuno será aproximadamente de 2 a 4 litros.

## Dosificación y forma de uso:

- Aplicar 30 mL de Torvan en 20 litros de agua limpia.
- 204 litros, cantidad apulverizar para vacuno adulto.
- Puede repetirse el tratamiento en intervalos de 4 - 6 horas.

**Especies de destino:** bovinos, caprinos y ovinos.

## Antídoto:

 Atropina. Precauciones:


Este producto es tóxico si se ingiere o se administra sobredosificado a los animales. No se deben sacrificar animales cuya carne se destine para consumo humano hasta 48 días después del último tratamiento. No se utilice en vacas en ordeño.

## Presentación:

- Frasco de 100 ml
- Bote de 1 litro



# VAMPIGEL



## Indicaciones:

Vampigel es un producto diseñado para el control de vampiros hematófagos que causan heridas en bovinos, equinos, ovinos, caprinos y cerdos.

## Composición:

Warfarina 1.00 g., Excipientes c.s.p.

## Dosificación y forma de uso:

Debe colocarse con una paleta de madera directamente sobre la parte mordida por el vampiro, cubriendo cuidadosamente el área con una capa uniforme y delgada.

## Sugerencia:

El tratamiento debe hacerse en horas de la tarde (17:00 a 18:00 horas) todos los días, durante una semana o cuando el daño desaparece.

## Precauciones:

Este producto no debe tocarse directamente con las manos.

Lávese bien las manos con agua y jabón después de utilizarlo.

## Presentación:

- Tarro de 120 gr



# LARVIWELL

## LARVICIDA REPELENTE Y CICATRIZANTE PARA HERIDAS Y AFECCIONES DE LA PIEL EN GENERAL

### Indicaciones:

Como larvicida debe usarse en áreas de miasis (gusaneras) causando la muerte instantánea de las larvas interfiriendo con la reproducción de las moscas, tábanos y otros insectos. Se utiliza también como cicatrizante, promoviendo el rápido secado de las heridas. Heridas en general, de piel, castración, corte de orejas y cola, ombligo de los recién nacidos.

### Composición:

Oxitetraciclina 2.0 g, Violeta de Genciana 0.5, Vehículo c.s.p.

### Administración:

Aplicar sobre el área afectada.

### Dosificación y forma de uso:

Rocíe sobre el área infectada, sosteniendo el envase a 15 cms de la herida. Aplicar sobre toda la herida, asegurándose que el producto penetre profundamente. Repita el tratamiento cada 12-24 horas hasta que la herida cicatrice completamente.

### Precauciones:

No utilizar el producto en los ojos  
No perforar el envase , ni usarlo  
cerca del fuego.

### Presentación:

- Frasco de 120 mL
- Lata aerosol 170gr.



**ANTISÁRNICO**

# LARVICIDA REPELENTE Y CICATRIZANTE PARA HERIDAS Y AFECCIONES DE LA PIEL EN GENERAL

## **Descripción**

### **Indicaciones:**

Combate eficazmente la dermatosis (jiote) producida sarna e infecciones fungosas

### **Composición:**

Cada 10 ml contienen: Ester dietílico de ácido mercaptosuccinato 8 g; 2,2-diclorovinil dimetil éster de ácido fosfórico (diclorvos) 1 g; ácido salicílico 2 g.

### **Administración:**

Tópica

### **Dosificación y forma de uso:**

Aplice con isopo en pequeñas afecciones, repita el tratamiento cada 3 días durante 2 semanas. En casos severo y animales grandes realice un baño mezclando medio frasco (50 ml) en un galón de agua, repita el baño cada 5 días durante 4 semanas.

### **Precauciones:**

No administrar en equinos. Este producto es tóxico para animales y seres humanos si se ingiere o se utiliza en forma descuidada.



### **Presentación:**

- Bote de 100 ml



# NEOWELL VET

# ANTIBIÓTICO

## Indicaciones:

Antibiótico y cicatrizante para usar en casos de úlceras cutáneas, infecciones de la piel, quemaduras, heridas infectadas y abrasiones de la piel entre otros.

## Composición:

Neomicina - clobetasol

## Administración:

Colocar una capa delgada sobre la lesión una o dos veces por día.

Precauciones: No utilizar en hembras gestantes. No administrar ante la presencia de tumores. En animales jóvenes una sobredosis puede causar osificación prematura. En animales destinados para el consumo humano debe suspenderse el tratamiento por lo menos 30 días antes del sacrificio.

## Forma de aplicación y uso:

Puede utilizarse en todas las especies de animales, aplicar en capa delgada sobre la lesión una o dos veces por día

## Presentación:

- Spray de 30 grs



# DEXIUM FORTE

# ANTIINFLAMATORIO PARA PERROS Y GATOS

## Indicaciones:

Para el tratamiento de procesos inflamatorios infecciosos o no, lesiones músculo esqueléticas, dermatitis, eczemas, cojera artrítica, artritis, estados de trabajo excesivo o estrés.

## Composición:

Dexametasona 0.5 mg.

**Administración:** Oral.

**Dosificación y forma de uso:** Perros:

0.25 a 1.25 mg/día según tamaño; equivalente a 1/2 a 2 1/2 tabletas diarias.

**Felinos:**

0.25 mg/día; equivalente a 1/2 tableta diaria.

## Precauciones:

No utilizar en hembras preñadas durante el último tercio de la gestación.

No utilizar en infecciones virales.

No utilizar en animales con tuberculosis, nefritis crónicas, síndrome de Cushing o en úlceras pépticas, excepto para los casos de una terapia de emergencia.

## Presentación:

- Caja de 150 Tabletas



# GASTROPET

## INHIBIDOR DE LA BOMBA DE PROTONES



### FÓRMULA:

#### Cada tableta contiene:

Omeprazol  
Excipiente c.b.p.  
20 mg  
1 tableta



### INDICACIONES:

Para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el sangrado de la esofagitis erosiva y crónica; en la erradicación de *Helicobacter heilmanni* para reducir el riesgo de la recurrencia de la úlcera duodenal.

### ESPECIES:

Caninos y felinos

### DOSIS:

Caninos y felinos: de 0.7 a 2.0 mg/kg de peso o 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

### ADVERTENCIAS:

Omeprazol está contraindicado en pacientes que hayan demostrado hipersensibilidad al medicamento. Manténgase este producto en un lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol. Manténgase este producto fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIÓN:

Caja con 20 tabletas.

