



ANTIPARASITARIOS



ORALES E INYECTABLES

GANAVERM GRANULADO

ANTIHELMÍNTICO DE AMPLIO ESPECTRO



**PARA BOVINOS, PORCINOS,
EQUINOS, CAPRINOS Y OVINOS.**

FÓRMULA:
Cada 100gr contiene:
Albendazol 20 g
Excipientes, c.s.p..... 100 g

INDICACIONES:

Ganaverm granulado es un desparasitante de amplio espectro indicado para el control y tratamiento de parasitosis internas del ganado: bovino, caprino y equino. Elimina los parásitos gastrointestinales: tenias, parásitos pulmonares: nemátodos pulmonares, hígado: fasciola hepática. Desde los huevecillos hasta las formas adultas de los parásitos.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, caprinos y equinos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral. Mezclado con el alimento o con el agua de bebida (disolver el contenido del sobre en 1/2 litro de agua o en 1 Kilo de alimento), agitar vigorosamente y administrar inmediatamente.

DOSIS:

1 sobre de 10 g por cada 400 Kg (800 lbs) de peso, equivalente a 2000 mg de Albendazol por cada 400 Kg de peso (5 mg por cada Kg de peso). En caso de Fasciola hepática, duplicar dosis a criterio del médico veterinario.

PERÍODO DE SUPRESIÓN:

Debe de transcurrir un lapso de 3 días después del tratamiento antes de destinar leche para consumo humano y un lapso de 14 días antes del sacrificio de los animales cuya carne se destine para el consumo humano.

ADVERTENCIA:

No administrar en hembras durante los primeros 45 días de gestación y a equinos destinados al consumo humano.

INTERACCIONES:

La dexametasona puede aumentar la concentración de sulfóxido de albendazol. La cimetidina aumenta las concentraciones de sulfóxido de albendazol en la bilis. Los alimentos aumentan la absorción de albendazol.

VACUNOS: 1 sobre para 800 lbs de peso

CERDOS: 1 sobre para 500 lbs de peso

EQUINOS: 1 sobre para 600 lbs de peso

Presentación:

- caja 25x10grs



CERDIWELL

DESPARASITANTE PARA CERDOS

FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:
Albendazol ..w.6 a
Excipiente c.b.p. 100 g

INDICACIONES:

Elimina eficazmente los parásitos gastrointestinales y pulmonares, desde huevecillos y larvas hasta formas adultas.

DOSIFICACIÓN:

Un sobre de Cerdiwell por cada 45 kg (100 lbs) de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral. Adminístrelo mezclado con el alimento.

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA:

Desparasitante.

PERÍODO DE SUPRESIÓN:

- Carne 10 días de la última dosis


PRESENTACIÓN:

- 75 sobres x 6grs

Contiene:
75 sobres de 6 gramos

CERDIWELL®
Albendazol al 6%

GRANULADO



USO VETERINARIO

ELIMINA EFICAZMENTE LOS PARÁSITOS GASTROINTESTINALES Y PULMONARES, DESDE HUEVECILLOS Y LARVAS HASTA FORMAS ADULTAS.

DOSIS:
UN SOBRE DE CERDIWELL POR CADA 45 Kg (100 Lbs).


VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
ORAL. ADMINÍSTRELO MEZCLADO CON EL ALIMENTO.

Producto medicinal veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor.

Conservar a una temperatura menor a 30 °C. Lea la etiqueta antes de utilizar el producto.



PANAWELL 10%



Período de retiro o supresión:

Debe transcurrir un lapso de 8 días después del tratamiento, antes de destinar la carne para consumo humano.

NO HAY PERÍODO DE RETIRO EN LECHE.

Precauciones:

No tienen ningún tipo de contraindicaciones. No es necesario tomar medidas dietéticas, puede combinarse con vacunaciones.

Indicaciones:

Infestaciones por los siguientes parásitos gastrointestinales y pulmonares de los bovinos, ovinos, caprinos, equinos, caninos y felinos.

Composición:

Cada 100 mL contiene: Fenbendazol 10 g, vehículo, c.s.p

Administración:

Oral.

Dosis en perros:


1ml / 5kg de peso

Presentaciones:


- Litro
- Frasco 500 ML
- Galón 3.5 litros



Peso corporal	Bovinos, Ovino y Caprinos	Equinos
	5 mg de FBZ / kg de peso de 1mL / 20 kg	7.5 mg FBZ/kg de peso de 1mL / 13 kg
60 kg	3.0 ml	4.5 ml
80 kg	4.0 ml	6.0 ml
120 kg	6.0 ml	9.0 ml
200 kg	10.0 ml	15.0 ml
400 kg	20.0 ml	30.0 ml
600 kg	30.0 ml	45.0 ml



PANAWELL 4%



- Alta absorción en el tracto digestivo (90%)
- Excelente control sobre parásitos pulmonares y gastrointestinales
- Facilidad de dosificación (mezclado en el alimento)
- Sin retiro en huevos para consumo humano
- Se recomienda usar 2 veces al año en aves ponedoras

Composición:

Cada 100 mL contiene: Fenbendazol
10 g, vehículo, c.s.p

Administración:

Oral.

Dosis en cerdos:

10gr / 220lbs de peso vivo

Dosis en aves:

mezclar 10gr en 15lbs de alimento y
administrar por 3 días.

Rinde para:

- 20 gallinas de 4 a 5 lbs
- 40 pollos de 2 lbs

Presentación:

- Caja con 25 sobres de 10g





IVERWELL AVES

Indicaciones:
Iverwell aves es un antiparasitario de amplio espectro, eficaz y potente contra parásitos internos y externos.



Formula:

Cada ml de solución contiene: Ivermectina..... 10 mg Excipientes...c.s.

Especie de destino:

Aves

Vía de administración:



Oral, directamente en el pico de las aves o incorporado en el agua de bebida.

Dosis:

Administrar una gota en el pico del ave o diluido en el agua de bebida. Para medicar un promedio de 20 aves pequeñas, diluir 1 ml (20 gotas) del producto en 1 litro de agua de bebida. Parasitosis interna: Administrar la dosis durante 1 día y repetir a los 15 días. Parasitosis externa: Administrarla dosis durante 2 días consecutivos y repetir el tratamiento a los 15 días.

Precauciones:

Para asegurar el consumo total del medicamento, restringir el agua de bebida 2 horas antes de la administración.

Medicar preferentemente por las mañanas. Iverwell aves mezclado en el agua de bebida para aves es estable durante las 12 horas siguientes a la preparación.

Periodo de retiro:

8 días en carne.

No posee periodo de retiro en ponedoras.

Presentación:

- 10 ml x 10 frascos





IVERWELL PASTA

Antiparasitario interno
y externo para equinos.

Indicaciones:

Iverwell Pasta está indicado para el control y tratamiento de las infestaciones parasitarias internas y externas que afectan a los equinos.

Parásitos internos como *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus* y *Strongylus edentatus*, *Parascaris equorum*, *Gasterophilus* sp., tenias como *Anoplocephala magna*, *Anoplocephala perfoliata*, *Paranoplocephala mamillana*. Parásitos externos como: piojos y ácaros de la sarna.

Composición:

Ivermectina 12 mg., Prazicuantel 150 mg.
Administración: Oral.

Dosificación y forma de uso:

1 mL por cada 60 Kg de peso corporal.

Precauciones:



No destinar carne para consumo humano hasta 30 días después del último tratamiento.

Presentación:

- Caja con 14 jeringas de 10ml c/u, 14x10 mL



IVERWELL 1%



IVERMECTINA PARA: BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS Y PORCINOS.

Indicaciones:

Producto altamente efectivo para el control y tratamiento de nemátodos gastrointestinales, parásitos pulmonares y ectoparásitos como larvas de moscas (*Dermatobia hominis*), piojos chupadores, ácaros de la sarna en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. También puede utilizarse como una ayuda en el control de garrapatas.

Composición:

Ivermectina 10 mg., Vehículo c.s.p.

Administración:

Subcutánea o intramuscular.

Dosificación y forma de uso:

Bovinos, ovinos y caprinos:

1 mL por cada 50 Kg (100 lbs.) de peso vivo.

Porcinos: 1 mL por cada 33 Kg (70 lbs.) de peso vivo.

Período de supresión:

No destinar carne para consumo humano hasta 28 días después del último tratamiento.

Precauciones: No utilizar en hembras cuya leche se destine para el consumo humano.

Presentaciones:

- Frasco de 10 mL
- Frasco de 50 mL
- Frasco de 100 mL
- Frasco de 200 mL
- Frasco de 500 mL

IVERWELL TOTAL L.A.

ENDECTOCIDA VITAMNADO



DESPARASITANTE Y SUPLEMENTO VITAMÍNICO

Indicaciones:

Iverwell Total L.A. es un desparasitante que elimina parásitos internos y externos, además contiene las vitaminas necesarias para un buen crecimiento y desarrollo de los animales y mejora la reproducción (fertilidad).

Composición:

Ivermectina 20 mg., vitamina A 20.000 UI, vitamina D3 2.000 UI, vitamina E 20 UI.

Administración: Intramuscular.

Dosificación y forma de uso:

Bovinos, ovinos y caprinos:

1 mL por cada 90 Kgs. (200 lbs.) de peso.

Porcinos: 1 mL por cada 55 Kgs. (120 lbs.) de peso.

Precauciones:



No se utilice en vacas de ordeño cuya leche se destine para consumo humano, ni 28 días antes del parto.

Presentación:

Frasco de 10 mL

Frasco de 100 mL

Frasco de 500 mL



IVERWELL 4x4



IVERMECTINA DE LARGA ACCIÓN PARA BOVINOS. 84 DÍAS LARGA ACCIÓN.

Indicaciones:

Producto altamente efectivo para el control y tratamiento de nemátodos gastrointestinales, parásitos pulmonares y ectoparásitos como larvas de moscas (*Dermatobia hominis*), piojos chupadores, ácaros de la sarna en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. También puede utilizarse como una ayuda en el control de garrapatas.

Composición:

Ivermectina 40 mg., cada 10ml, Vehículo c.s.p.

Administración:

Subcutánea.

Dosificación y forma de uso:

Bovinos:

1 mL por cada 50 Kg (100 lbs.) de peso vivo.

Período de supresión:

No destinar carne para consumo humano hasta 28 días después del último tratamiento.

Precauciones: No utilizar en hembras cuya leche se destine para el consumo humano.



Presentaciones:

- Frasco de 20 mL
- Frasco de 50 mL
- Frasco de 200 mL
- Frasco de 500 mL





VITAMINAS

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS

VITAVET TOTAL MULTIVITAMÍNICO EN SOLUCIÓN INYECTABLE. VITAMINAS AD3E + COMPLEJO B

Indicaciones:

Complejo de vitaminas indicadas para mejorar el crecimiento, engorde y reproducción. En el tratamiento de raquitismo, convalecencia, agotamiento, falta de apetito, dermatitis, osteomalacia, infertilidad y trastornos nerviosos. En general, ayuda en tratamientos antiparasitarios, hormonales, vacunaciones y todos los estados que impliquen deficiencias vitamínicas. También para el tratamiento de anemias, debilidad y estrés.

Composición:

Vitamina A 20,000 UI, Vitamina D 2,000 UI, Vitamina E 20 UI, Vitamina B1 25 mg., Vitamina B2 10 mg., Vitamina B3 50 mg., Vitamina B5 10 mg., Vitamina B6 25 mg., Vitamina B12 100 mcg., Vehículo c.s.

Administración:




Intramuscular profunda.

Dosificación y forma de uso:

Bovinos y equinos 5-10 mL., **cerdos** 5-8 mL.,
Ovejas y cabras 3-5 mL., **perros y gatos** 1-3 mL.

Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Presentación:

- Frasco de 10 mL
- Frasco de 100 mL
- Frasco de 500 mL



VITA B12

VITA B12 CON FÓSFORO ORGÁNICO

VITAMINAS PARA BOVINOS, EQUINOS, TERNEROS, POTROS, PORCINOS, LECHONES, CORDEROS, OVINOS, CAPRINOS, CANINOS, FELINOS Y AVES.

Indicaciones:

Vita B12 con fósforo orgánico mejora el rendimiento muscular y el estado general, ayuda en el engorde, corrige trastornos metabólicos, falta de apetito, agotamiento post-enfermedades. Es útil en recién nacidos y en animales sanos en caso de esfuerzos excesivos. Reconstituyente después de partos difíciles y deficiencias alimenticias. Co-adyuvante en el tratamiento de esterilidad. Trastorno de celo de vacas. En toros jóvenes con impotencia por carencia de fósforo.

Composición:



Butafosfán 10 g., Vitamina B12 (Cianocobalamina) 5 mg.

Administración:

Intramuscular, subcutánea, intravenosa.
En aves en el agua de bebida.

Dosificación y forma de uso:

Bovinos y Equinos 15-25 mL., Terneros y Potros 8-15 mL, Porcinos adultos 5-10 mL., Lechones y Felinos 1-5 mL, Gallos de pelea 1 mL.



Presentación:

Frasco de 25 mL
Frasco de 50 mL
Frasco de 100 mL
Frasco de 250 mL

FERRADOX PLUS

TÓNICO RECONSTITUYENTE REMINERALIZANTE PARA BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, PORCINOS, CANINOS Y FELINOS.

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de las deficiencias de hierro. Ayuda en el tratamiento de anemias, pérdida de apetito, retardo de crecimiento y mejora la resistencia a enfermedades infecciosas.

Composición:

Cada 100 mL de solución inyectable contiene: Hierro dextrano 20 g. vitamina B12 20 mg, vehículo c.s.

Administración:

Intramuscular profunda.

Precauciones:


No administrar con tetraciclinas debido a su interacción con el hierro. No administrar con en animales con diarrea. No administrar en animales que tengan deficiencia de Selenio y Vitamina E

Dosificación y forma de uso:

Bovinos y equinos	5 mL
Porcinos, ovinos y caprinos	3 mL
Lechones recién nacidos	1 mL
Caninos y felinos	0.5-1 mL

Presentaciones:

- Frasco de 10 mL
- Frasco de 50 mL
- Frasco de 100 mL



VITAWELL

COMPLEJO DE VITAMINAS Y MINERALES

CIENTÍFICAMENTE BALANCEADOS PARA PROVEER A CANINOS Y FELINOS EL SUPLEMENTO NECESARIO PARA UNA BUENA NUTRICIÓN CON OLOR Y SABOR A CARNE.

Indicaciones:

Controla la caída del cabello, le dá brillo y lo fortalece. Indicado para la gestación y la lactancia de perras. Mejora la condición de perros de guardia y exposición. Aumenta el apetito.

Composición:

Cada Tableta contiene: Vitamina A 1,650 UI., Vitamina D3 150 UI., Vitamina E 2 UI., Tiamina 1 g., Riboflavina 1 mg., Niacina 10 mg., Piridoxina 0.20 mg., Vitamina B12 8 .00 mcg., Pantotenato de calcio 0.80 mg., Ácido fólico 0.05 mg., Colina 20.00 mg., Calcio 200 .00 mg., Fósforo 100.00 mg., Hierro 9.00 mg., Cobre 0.40 mg., Cobalto 0.135 mg., Yodo 0.50 mg., Zinc 1.00 mg., Manganeso 1.00 mg., Magnesio 50.00 mg., Proteína 500.00 mg., DL-Metionina 27.00 mg., Grasa Insaturada 25.00 mg., Excipientes c.s.p.

Administración y dosis:

Debido a su agradable olor a carne, es muy apetecido por los animales. Puede mezclarse con el alimento.

Perros pequeños y gatos: 1 tableta al día.

Perras preñadas o lactantes: 2 tabletas al día.

Perros sanos como suplemento alimenticio: 1 tableta al día.


Perros enfermos o convalecientes: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor. Conservar a una temperatura menor a 30 oC.

Presentación:

- Tarro con 50 tabletas



AVIWELL

ANTIESTRÉS



FÓRMULA:

Cada 100 g contiene:

Vitamina A 50,000 UI, Vitamina D3 10, 000 UI, Vitamina E 50 UI, Vitamina B1 10 mg, Vitamina B2 20 mg, Vitamina B6 10 mg. Vitamina B12 200 mcg, Vitamina C 1.7 g. Vitamina K3 0.14 g. Carbonato de calcio 1.0 g, Cloruro de sodio 1.8 g Sulfato de magnesio 0.57 g. Cloruro de Potasio 1.8 g. Dextrosa anhidra 71.6 g, Ácido pantoténico 50 mg, Oxitetraciclina HCl 250 mg.

INDICACIONES:

Tratamiento de enfermedades infecciosas respiratorias y antiparasitarias. Por su aporte de vitamina A es apto para el tratamiento de enfermedades respiratorias y enteritis infecciosa.

Coadyuvante para el tratamiento de la tensión y estrés en las aves.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

FORMA DE USO Y DOSIS:

50 mg (la punta de un cuchillo), disuelto en agua de bebida por 5 días consecutivos o conforme a la indicación del médico veterinario

PRESENTACIONES:

- Ristra 20x10gr



CALPHO - PET

SUPLEMENTO DE CALCIO, FÓSFORO Y VITAMINA D3 TABLETAS

FORMULA:

Cada tableta contiene:
Calcio (fosfato dicálcico) 600 mg
Fósforo (fosfato dicálcico) 464 mg
Vitamina D3 colecalciferol 400 UI
Excipiente c.b.p. 1 tableta

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

Calpho - Pet está recomendado como suplemento dietético de calcio, fósforo y vitamina D3

ESPECIES:

Caninos y felinos.

DOSIS:

Administrar una tableta por cada 10 kg de peso diariamente.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral o bien molido y mezclado con el alimento.

ADVERTENCIAS:

No se deje al alcance de los niños ni de los animales domésticos o personas discapacitadas
Mantenga el producto en un lugar seco y fresco y protegido de la luz directa
Para uso exclusivo veterinario.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 30 tabletas

